

Flödesschema rutin vid salmonella i ägg

Salmonella på/i ägg som berör ditt packeri, **Positivt prov från packeri eller producent**

Rutinen delar sig i två vägar beroende på vilken salmonellatyp det gäller, och hur aggressiv den är. Bedömning krävs ändå från fall till fall, och vilken väg som följs kan till exempel bero på utbrottets omfattning eller om äggen tvättats eller inte.

Väg 1: Mer aggressiv typ som i **högre** grad kan finnas i ägg

Salmonella Enteritidis och i vissa fall även andra typer

Återkalla och dra tillbaka misstänkt smittade partier från marknaden. Informera konsumenter om lämpliga åtgärder

Upprätta återkallelselista och kontakta alla kunder

Kassera återkallade ägg eller leverera till produkt-industri

Stoppa omgående alla utleveranser

Fastställ producent-kod och bäst före-datum

Spärra och avskilj kvarvarande ägg från det smittade partiet

Frisläpp ägg från andra producenter

Invänta serotypning

Misstanke om salmonella, **larm från slut-konsument**

Invänta bekräftelse genom analyserat prov

Salmonella Typhimurium och andra typer som oftare hittas i träck och utanpå ägget

Dra tillbaka från livsmedels-kedjan men inte slut-konsument

Omklassa smittade A-ägg till B-ägg

Salmonella med högre risk: Salmonella som kan förflytta sig från mag- tarmkanalerna och komma in i ägget och sedan orsaka sjukdom hos människa.

Salmonella med lägre risk: Salmonella som kan finnas utanpå skalet och kan orsaka sjukdom hos människa.

OBS: Vid felaktig hantering kan även typer med lägre risk komma genom äggskalet och utgöra högre risker hos människa. Därför är det viktigt att alltid göra en bedömning från fall till fall.

Väg 2: Mindre aggressiv typ som i **lägre** grad kan finnas i ägg

Noggrann rengöring av utrustning och lokal bör ske samtidigt som de akuta åtgärderna, för att förhindra vidare spridning